

台大醫院眼科部 斜視病患臨床路徑說明表

	住院日	(手術當天)	(出院當天)	出院後居家照護
監測	身高、體重 體溫、脈搏 呼吸、血壓	術前: *體溫,心跳,呼吸,血壓 術後: *體溫,心跳,呼吸,血壓 *傷口情形	*體溫,心跳,呼吸,血壓 *傷口情形並換藥	
檢驗、治療藥物	全身麻醉病人 確定已作心電圖、照X光、抽血等檢查 *住院醫師作檢查 *麻醉醫師來診 *注射留置靜脈軟針 局部麻醉病人 住院醫師作檢查	全身麻醉病人 術前:點滴注射 術後: *服用抗生素 3 天 *術後進食可, 拔除軟針 局部麻醉病人 術前:服用口服藥 術後: *服用抗生素 3 天	*傷口換藥	口服藥服用三天即可 點眼藥衣照護理人員指導使用
飲食活動	全身麻醉病人 *手術前一天晚上 12 時後禁食一切 *正常活動 局部麻醉病人 *正常飲食與活動	全身麻醉病人 術前:禁止飲食及喝水 術後:依照護理人員指導進食 局部麻醉病人 術前:可正常進食 術後:依情況休息 10-30 分後即可進食	正常飲食與活動	正常飲食與活動
注意事項	*填寫手術麻醉同意書 *要離開病房請告知當班護理人員	術前: *更換手術衣,移除全身飾物,假牙等等... .. 術後: *可更換手術衣穿自己衣服	*教導傷口照顧方法 *能夠知道傷口照顧方法	*自行點藥 *點藥前請洗手 *用乾淨毛巾或衛生紙擦拭眼睛 *術後一週不要讓洗髮水流入眼內 *不要用手揉眼

