

Sulfamethoxazole & Trimethoprim (Co-trimoxazole)

錠 & 懸液劑

主成份	商品名	中文商品名	含量
Sulfamethoxazole & Trimethoprim (Co-trimoxazole)	Baktar Tablet	撲菌特錠	Sulfamethoxazole 400 毫克 & Trimethoprim 80 毫克/錠
	Sulfacotrim Suspension	沙法克寧懸液劑	Sulfamethoxazole 40 毫克 & Trimethoprim 8 毫克/毫升 60 毫升/瓶

作用：

本藥適用於細菌引發之各種感染病症，包括泌尿道、肺、耳朵、消化道的感染。也用於治療旅行者腹瀉，及預防與治療由肺囊蟲引起之肺炎。

劑量與用法：

本藥需由醫師處方服用，劑量用法依人及病情而異。請務必遵照醫囑或藥袋上之指示按量按時服用。有任何疑問應請教醫師或藥師。本藥通常一天服用兩次，每次一到兩錠，且應按平均的用藥間隔服用（如每天2次即每12小時服用一次）。用於肺囊蟲肺炎時之劑量可能較高，服用次數亦可能更頻繁。懸液劑應先搖勻再使用。

注意事項：

- 下列情形不建議使用此類藥品，應主動告知醫師：
 - 曾對磺胺類藥物或 sulfamethoxazole & trimethoprim 過敏者。
 - 兩個月以下嬰兒應避免使用本類藥物。
 - 曾因 sulfamethoxazole & trimethoprim 引起免疫性血小板缺乏症病人。
 - 有嚴重肝臟疾病或腎臟疾病病人。
 - 因缺乏葉酸所引起的巨芽性紅血球貧血病人。
 - 懷孕或授乳婦女應避免使用本類藥物。
- 其他如年紀較大，或原本就有氣喘、嚴重過敏體質者、甲狀腺功能異常、肝功能腎功能不全、紫質症的病人，較容易出現副作用。
- 每天至少應喝八杯水或其它飲料，減少可能發生的腎臟結晶副作用。
- 本藥可能使皮膚對日光的感受性增強，必要時可穿長袖長褲等防護性的衣物或使用防曬製品。
- G-6PD 缺乏者（即俗稱蠶豆症病人），在高劑量時容易出現溶血反應。

本教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

6. 不可擅自停用藥物，即使自己覺得症狀改善仍應依照醫囑將藥物全部服用完畢以免病症再度復發。若已經將全部藥物服用完畢，病症仍未改善，應再就醫，不可自行購藥服用。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有那些？如果發生了該怎麼辦？

服藥後副作用不常發生，但偶有：

症狀	如何處理
皮膚出現紅疹、搔癢感或脫皮現象、喉嚨刺痛、發燒、寒顫、不正常的皮下瘀血或出血，皮膚或眼睛變黃，關節疼痛等	請停藥，並立即就醫
噁心，嘔吐，食慾不振等症狀	與食物一起服用。當情況嚴重或持續發生時，請告知醫師

藥品該如何存放？

儲存於室溫下，避免熱、潮濕或是日光直射，錠劑及液劑均勿置於冰箱，並請參考藥袋說明。