

Eltrombopag 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Eltrombopag Olamine	Revolade Tablet	返利凝膜衣錠	25 毫克/錠

作用：

1. 促進血小板生成。
2. 用於治療在脾臟切除後且對於其他治療（例如：類固醇、免疫球蛋白等）失敗之成年慢性自發性（免疫性）血小板缺乏紫斑症（ITP）病人，或對於不適合進行脾臟切除之成年慢性自發性（免疫性）血小板缺乏紫斑症（ITP）病人之第二線治療。
3. 用於慢性 c 型肝炎病毒（HCV）（感染的成年患者，治療其因血小板減少症而無法順利展開及持續干擾素治療。

劑量與用法：

1. 遵照醫師處方按量按時服用。
2. 一般的開始劑量為每日一次，每次 25 毫克。視需要調整劑量，使血小板計數維持約 $> 50 \text{ K}/\mu\text{L}$ ，但也不應使血小板計數超出參考區間。每日劑量請勿超過 75 毫克。食物會降低 eltrombopag 的吸收，建議空腹服用（飯前 1 小時或飯後 2 小時）。

注意事項：

1. 服用制酸劑、乳製品、或含有多價陽離子（鐵、鈣、鋁、鎂、鋁、硒、鋅）的產品時，應與 eltrombopag 相隔 4 小時服用。
2. Eltrombopag 可能會造成肝功能異常，在治療期間，應定期檢查 AST、ALT 和膽紅素濃度。
3. 若女性患者計畫懷孕或哺乳，請事先告知醫師。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用，但如果想起時接近下一次的服藥時間，只需服用一次劑量，不可服用兩次的劑量。

此藥可能引起的副作用有那些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
頭痛、失眠、感覺異常、白內障、眼乾、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、上腹痛、皮疹、搔癢、關節痛、肌肉痛、疲勞、周邊水腫	症狀持續，則應告知醫師

藥品該如何存放？

存放於 30°C 以下。

本單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師