

主成份	商品名	中文商品名	含量
Isotretinoin	Roaccutane Capsule	羅可坦軟膠囊	10 毫克/膠囊
			20 毫克/膠囊

作用：

本藥用於治療嚴重的痤瘡（青春痘）。

劑量與用法：

1. 請依照醫師或藥師指示，通常一天服用二次。建議與食物併服，可減少對食道的刺激。
2. 在治療初期，症狀可能會暫時性惡化，但四~六週後將漸改善。
3. 若需管灌餵食之病人，可於暗處刺破膠囊，擠出油性內容物，與水或流質食物混合後立即服用。

注意事項：

1. 治療前及治療後每 4~6 週需偵測全血球數，治療期間或疑似糖尿病人者，需偵測血糖或餐後 2 小時血糖，治療前及治療後每一或二週需偵測血漿脂肪及肝功能指數。
2. 本藥須由醫師處方。服用本藥請勿額外補充維生素 A。亦勿服用金絲桃（St. John's wort）。
3. 服藥期間可能須做血液檢驗，以便調整劑量。
4. 本藥會升高血中三酸甘油酯，故服藥期間應限制攝取脂肪性食物及酒精性飲料。
5. 如有糖尿病、高血脂或高血脂家族者，請告知醫師。
6. 須做例行性驗孕，欲懷孕、已懷孕、授乳者禁用本藥。
7. 本藥使用前一個月、使用期間及停藥後一個月內，須實行持續、有效的避孕措施。
8. 本藥之內容物為油性液體，具黏膜刺激性、致畸胎性，懷孕或可能懷孕的婦女勿處理本藥。
9. 服藥期間應避免日曬。
10. 服用本藥期間及停藥後一個月內，請勿捐血。
11. 治療期間或停止治療後可能有夜間視力減弱之情形發生，因此在夜間駕車或操作機器應特別注意。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
骨痛或關節痛、持續頭痛、頭昏眼花、嘔吐、腹痛、肌肉痛、脫皮、皮膚發炎、視力障礙等	請立即就醫
皮膚乾燥、眼睛乾燥、口乾、頭痛	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。

NOTICE