

Mercaptopurine (6-MP) 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Mercaptopurine (6-MP)	Purinetone Tablet	莫剋普寧錠	50 毫克/錠
	Mercaptopurine Tablet	美克多能錠	

作用：

Mercaptopurine 是化學治療劑，也是免疫抑制劑。

劑量與用法：

1. 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 合併其他藥物治療時，請確定每種藥品的服用時間，勿任意混合。
3. 請補充足夠的水份（每天 6-8 杯），以增加尿液排出量。
4. 如果服藥後不久就吐出來，請告知醫師確認是否需補服此次劑量。

注意事項：

1. 使用本藥前及使用中，請定期監測病人之肝功能、血比容或血紅素、白血球及血小板。
2. 此藥會暫時使您的白血球及血小板降低，提高感染及出血之發生率，所以請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（例如：刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷，盡可能遠離有感染疾病的人，當您有任何感染症狀（發燒、發冷、咳嗽、沙啞、下背或側背疼痛、排尿疼痛或困難）出現，請立即就醫。
3. 如果您曾對本藥或 thioguanine 過敏，請告知醫師。
4. 服用此藥期間需避孕，若懷疑受孕要馬上告知醫師。
5. 服用本藥勿授乳。
6. 使用本藥之前，請告知醫師目前您使用之所有藥品，以及曾服用過的抗腫瘤藥或接受之放射線治療。如有其他疾病，請告知醫師。
7. 請依醫師指示定期來診及做檢驗。
8. 服用此藥時，除非您的主治醫師指示，否則不可打預防針、疫苗；與您親近的人（例如：家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。請與接種活性疫苗者保持距離。
9. 如需看其他醫師或牙醫師，請主動告訴醫師目前您所使用的藥品。
10. 請避免喝含有酒精的飲料，酒精會增加藥物的毒性。
11. 本藥會影響糖尿病人尿糖的測試結果。
12. 服用本藥可能使痛風惡化。

本單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
發燒、發冷、咳嗽或嘶啞、排尿困難或疼痛、異常出血或瘀血、血尿、血便或黑便、皮膚出現針狀紅點、異常疲倦或虛弱、皮膚或眼睛變黃、關節痛、下背或腹側痛、腳或小腿腫大、失去食慾、噁心、嘔吐、口腔或唇部潰瘍等	請立即就醫
膚色變暗、腹瀉、頭痛、皮膚發疹或發癢、虛弱等	如果症狀持續或令人無法忍受時，請告知醫師

1. 為確保疾病能有效控制，有時藥品引起之副作用可能無法避免，若副作用發生且無法忍受時，請勿自行停藥，請告知醫師，由醫師評估後再作調整。
2. 停藥後，如果有下列現象產生請告知醫師：發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛、異常出血或瘀血、血尿、血便或黑便、皮膚出現針狀紅點、皮膚或眼睛變黃。
3. 某些病人亦可能出現上述未列之副作用，如果您注意到其它任何的副作用，請與醫師確認。

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。