

主成份	商品名	中文商品名	含量
Methotrexate	Methotrexate Tablet	滅殺除炎錠	2.5 毫克/錠

作用：

本藥是化學治療劑，亦可用來治療某些非腫瘤疾病（例如：乾癬、風濕性關節炎等）。

劑量與用法：

1. 請確認醫師指示的劑量與用法（每週幾次、每次幾錠），並且依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 合併其他藥物治療時，請確定每種藥品的服用時間，勿任意混合。
3. 空腹服用並補充足夠的水份，以增加尿液排出量。
4. 本藥常引起噁心及嘔吐，如有這些反應產生仍需繼續服藥，請教您的醫師或藥師如何減少這些反應產生。
5. 如果服藥後不久就吐出來，請告知醫師確認是否需補服此次劑量。
6. 如果發現不小心多服藥，請立即告知醫師。

注意事項：

1. 本藥使您的抗菌力降低，應避免與有傳染病的人接觸；如有任何感染症狀如發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛等，請立即就醫。
2. 如果您曾經對此藥有過敏反應，請告知醫師。
3. 女性服用此藥期間以及停藥後兩個月經週期內需避孕，期間若懷疑受孕要馬上告知醫師。男性在服藥期間以及停藥三個月內也需避孕。
4. 服用本藥勿授乳。
5. 新生兒、幼兒對本藥作用比較敏感。
6. 老人使用本藥比較容易產生不良反應。
7. 使用本藥之前，請告知醫師目前您使用之所有藥品，以及曾服用過的抗腫瘤藥或接受之放射線治療。如有其他疾病，請告知醫師。
8. 請依醫師指示定期來診及做檢驗。
9. 服用此藥時，除非您的主治醫師指示，否則不可打預防針、疫苗；與您親近的人（例如：家人）也應避免服用口服小兒麻痺疫苗及使用其他活性疫苗。
10. 注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（例如：刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。
11. 如需看其他醫師或牙科醫師，主動告訴醫師目前您所使用的藥品。
12. 避免喝含有酒精的飲料，酒精會增加肝的毒性。
13. 可能會有對光敏感的反應產生；避免在陽光下曝曬太久或過度使用日光

本教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

燈。

14. 合併使用含有阿司匹靈（aspirin）或水楊酸類藥品（salicylates），以及非類固醇類消炎藥（NSAIDs），可能增加本藥副作用發生的機率，如副作用發生或加重，請主動與您的醫師討論。
15. 服藥期間及停藥後短時間內，生育能力可能受損，可與醫師討論其風險。
16. 葉酸補充劑可能影響療效與副作用，除醫師所開立處方外，如欲服用葉酸補充劑或含有葉酸的多種維生素製劑，請與醫師充分討論。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
焦油狀黑便、嘔吐物帶血、腹瀉、腹痛；發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛、口腔及唇部潰瘍、異常出血或瘀血；血尿、關節痛、腳或小腿腫大、意識混亂、眩暈、痙攣、咳嗽、嗜睡、頭痛、背痛、呼吸急促、異常虛弱或疲倦、視力模糊、眼睛或皮膚變黃、深色尿等	請立即就醫
失去食慾、噁心、嘔吐、面皰、癩、皮膚蒼白、變紅、發疹、發癢等	如果症狀持續或令人無法忍受，請告知醫師
禿髮	不需治療，停藥後會再長

1. 為確保疾病能有效控制，有時藥品引起之副作用可能無法避免，若副作用發生且無法忍受時，請勿自行停藥，請告知醫師，由醫師評估後再作調整。
2. 停藥後如果有下列現象產生請儘快告知醫師：背痛、視力模糊、意識混亂、痙攣、嗜睡、眩暈、頭痛、異常虛弱或疲倦。

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。