

Dabigatran 膠囊

主成份	商品名	中文商品名	含量
Dabigatran Etexilate Mesylate	Pradaxa Capsule	普栓達膠囊	110 毫克/膠囊
			150 毫克/膠囊

作用：

這是一種抗凝血劑。用於預防非瓣膜性心房纖維顫動病人發生中風與全身性栓塞。

劑量與用法：

服用劑量因人而異，請遵照醫師指示的用法服用。一般劑量為每天兩次，每次一顆。空腹或飯後服用均可。

*須將膠囊整顆吞服，請勿弄破、研磨、咀嚼或取出膠囊內藥粒，因可能導致藥品吸收量不穩定增加。

注意事項：

1. 服用 dabigatran 之前，應主動告知醫師過去病史，尤其是凝血方面的疾病、腦中風、肝臟或腎臟疾病、細菌性心內膜炎、胃腸潰瘍、出血以及最近是否有接受腦部、脊髓或眼科手術...等。
2. 若您計劃懷孕或正在哺乳，以於服藥前主動告知醫師。若於服藥期間發現懷孕，請立刻告訴醫師。
3. 請讓所有照顧您的醫護人員知道您正在服用 dabigatran。尤其是在進行手術、拔牙或侵入性檢查前，請主動告訴醫師您正在服用抗凝血劑。
4. 因 dabigatran 會和藥物發生交互作用，因而增加或減低抗凝血效果，所以未經醫師許可，請不要自行停用目前正在服用的藥品或自行服用任何其他藥品、中草藥或保健食品(尤其是阿斯匹靈、非類固醇消炎止痛藥、抗凝血劑、血小板凝集抑制劑、抗結核藥品 rifampin、抗黴菌藥品 ketaconazole、治療心律不整藥品 amiodarone、dronedarone、verapamil、quinidine...等)。
5. 避免割傷自己，請小心刷牙或刮鬍鬚，盡量使用軟毛牙刷及電動刮鬍刀。
6. 避免用力挖鼻孔，可能導致嚴重流鼻血。
7. 避免從事容易引起挫傷、扭傷的危險性活動(例如：撞擊性的運動)。
8. 若發生不尋常的出血或瘀青，請立即就醫。
9. 請確定身邊有足夠的藥量，以避免中斷治療而導致中風或栓塞。
10. 請勿將藥品給其他人服用。並將藥品存在小孩不易取得的地方。
11. 若不小心服用過量，請立即告知醫師並和附近醫院急診室聯繫。

本單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

12. 若有任何疑問，請立即和醫師或藥師聯繫。

忘記用藥時該怎麼辦？

如果忘記服藥，想起時請立即服用；但是，如果已經接近下次服藥時間(小於6小時)，則不用補服，按照原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
出血現象(血尿、血便或黑便、不尋常的嚴重流鼻血或牙齦出血、皮膚瘀青、咳血、嘔吐出血或經血過多)，嚴重頭痛、頭暈或全身無力，過敏反應(皮膚癢、紅疹、蕁麻疹、臉部、手、嘴唇或喉嚨腫，胸悶，呼吸困難)，癲癇，皮膚起泡、脫皮	請立即就醫
腹痛、腹瀉、便秘、消化不良、胃灼熱、嚴重噁心、嘔吐、發燒、食慾差、虛弱、倦怠、皮膚疹	若症狀較嚴重或持續發生，請立即告訴醫師

藥品該如何存放？

儲存於 30°C 以下。儲存於原包裝，避免濕氣。