

子宮切除手術說明書

(若為腹腔鏡協助式陰道子宮切除術，詳再詳閱腹腔鏡手術說明單)

雖罕見但可能的併發症如下：(即使是最有經驗的資深醫師，一些手術併發症及副作用仍不可避免)

1. 出血、凝血不全：嚴重時須要輸血，故有輸血併發症之危險(詳見第(8)點說明)。甚至須術後緊急剖腹探查。
2. 感染：傷口感染發生於部份經腹部子宮切除術後，糖尿病、肥胖及合併其他內科疾患之病人較易發生。其他如傷口筋膜下血腫、傷口崩裂、滲液、腹水溢流等等。
3. 胃腸道受傷：婦產科手術中，小腸最容易受傷，嚴重時須切除腸道作人工造口。(接受多次腹部或骨盆腔手術，容易有嚴重骨盆腔黏連的患者，於黏連剝離術時容易造成腸道傷害、腸道內容物溢出，可能造成嚴重腹膜炎、敗血性休克，甚至死亡)。
4. 泌尿道受損：
 1. 尿液滯留：因為麻醉、疼痛、膀胱弛張、尿液阻塞或痙攣造成。
 2. 輸尿管阻塞或受傷：會造成後序腎臟受損，因此為嚴重之併發症，有時須導尿管及剖腹探查。
 3. 膀胱受損：切除子宮時，須將膀胱自子宮頸及上陰道剝離，因此容易造成膀胱損傷或穿孔，而有血尿的症狀。
 4. 膀胱陰道瘻管：較易發生於經腹式子宮切除手術。術後約 10~14 天會有清澈液體樣陰道分泌物，有些瘻管則於術後 48~72 小時產生，須置放導尿管。部份瘻管在 4~6 星期後自癒。
5. 陰道穹窿血腫或膿瘍、肉芽組織形成及出血、輸卵管脫垂。
6. 神經損傷：如股骨神經、股外側皮神經受損造成下肢無力或錯亂性感覺異常。
7. 精神心理層面：面對麻醉、手術的潛在危險，失去子宮及生殖能力，無月經週期，性功能障礙，害怕失去女人味及性行為滿足感……等等。大部份病人於子宮切除後並不會造成精神症發或性功能減低。
8. 伴隨輸血的危險包括：
 1. 輸血感染-愛滋病，B 型肝炎，C 型肝炎，寄生蟲感染等等。
 2. 溶血性輸血反應-發燒，畏寒，胸背痛，嘔吐，血壓降低，急性腎衰竭等等。
 3. 血量負荷過大，鬱血性心衰竭，肺水腫，輸血性抗宿主反應，體溫過低，檸檬酸鹽中毒(肝功能差者尤甚)，酸血症，血鉀過高，輸血後紅斑，風疹塊，皮膚搔癢，呼吸窘迫及出血等併發症。
9. 腹部疝氣(赫尼亞)，傷口崩裂，壞死性肌筋膜炎，骨盆腔膿瘍、蓄膿，腹膜炎，形成癥痕組織，蜂窩組織炎，腹腔內黏連，腸道痙攣性腹痛，血管栓塞，靜脈炎……等併發症。
10. 麻醉併發症及心肺併發症：如代謝性中毒、肺炎、換氣不足、食道插管、支氣管痙攣、心律不整、心臟停止、二氧化碳栓塞、肺水腫、右心衰竭、胃酸逆流併吸入(以肥胖、胃弛緩、裂孔疝氣及胃出口阻塞患者較常)。
11. 其他偶發病變 _____

其他部份已由主治大夫詳細口頭告知

患者或立同意書人對以上說明若有疑問，請在立同意書前詳細詢問有關醫師

閱畢請簽名交回: _____ 日期: _____年 _____月 _____日