



## 病友化療期間注意事項



化療藥物是具毒性物質，為維護自身及環境安全，請您於注射藥物期間最好不要離開病房活動，避免不慎造成藥物外漏。

1. 請勿自行調整點滴架高度，覺得太高或太矮，請告知護理師調整。
2. 請勿自行關掉機器，機器響請立即通知護理人員。
3. 機器使用時記得插電源，插頭拔掉注意僅能蓄電 30 分鐘。
4. 注射期間請小心慢速推行，推機器時重心往下較安全，可防止跌倒，行走時小心路況，可以請照顧者或醫護人員協助。
5. 注射入針處應低於點滴瓶至少 20 公分以上。化療時發生血液回流或注射部位疼痛或紅腫情形，應立即通知護理師，避免針頭被血塊阻塞或漏針。
6. 使用過的點滴瓶、針頭或針筒，應由護理師處理，切勿自行丟棄。
7. 點滴不小心掉落，請立即通知護理師，切勿自行接回。
8. 化療期間請於早餐前測量體重，並固定使用同一台的磅秤。
9. 化療期間若有任何不適，例如：噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、便秘等等副作用，請立即告知護理師，嘔吐物請倒入馬桶並蓋上馬桶蓋，連續沖水兩次，或以塑膠袋綁緊交給護理師處理。
10. 如廁前、後務必洗手。化療進行和結束後 48 小時的排泄物仍可能殘留化療藥，應避免直接接觸或處理前應戴手套保護自己。
11. 為減少化療期間病人的排泄物產生蒸發或噴濺造成環境污染，化療進行和結束後 48 小時期間：
  - (1) 在床上使用便盆或尿壺時應注意蓋上或移除食物托盤。
  - (2) 無論男女請一律採坐式馬桶，沖馬桶時要蓋上馬桶蓋，連續沖水兩次。
  - (3) 以舀水的方式清洗，不可以用水管噴洗。