

穿孔性腸炎手術

一、手術適用對象：主要是針對穿孔性腸炎

A. 流行病學及致病機轉

穿孔性腸炎可分為特定原因及原因不明兩大類。特定原因者包括感染引起，以及免疫異常或低下等。而原因不明者包括好發於早產兒的壞死性腸炎，以及較大孩童穿孔性腸炎。目前由於環境衛生以及藥物發達，以在急診室而言，由感染引起的穿孔性腸炎已較減少，而以原因不明的兒童穿孔性腸炎較常見。這類病人的血液或腹水可培養出一般的腸內菌而非特定病原菌，一般認為其致病機轉為脫水後造成局部腸缺血壞死，因此其穿孔處都在腸繫膜對側，分布於盲腸最常見，其他為升結腸、橫結腸及迴腸末端。

B. 臨床表現

通常病人都先有感冒腸胃炎症狀，食慾不佳造成脫水，幾天後病狀加重，出現脫水性休克及腹膜炎。

C 穿孔性腸炎治療

穿孔性腸炎需立即進行手術。

二、手術內容：

本項手術程序大致包括：

1. 腸段的切除或修補
- 2 近端小腸做一保護性造瘻（可做或不做）。

三、手術效益：本項手術預期目標為症狀緩解。

四、手術風險：所有手術都無法保證不會產生合併症及意外狀況，以下所列是可能的併發症：

1. 傷口感染。
2. 腹內積膿。
- 3 術後短期腸道蠕動不良
- 4 粘黏性腸阻塞