

粘黏性腸阻塞手術

一、手術適用對象：主要是針對粘黏性腸阻塞：

A. 流行病學及致病機轉

只要是接受過腹部手術的病人，一旦發生腸阻塞，就必須考慮粘黏性腸阻塞的可能。以台大小兒外科而言，急性闌尾炎破裂合併腫瘤形成後開刀所造成的粘黏性腸阻塞最多。其造成腸阻塞的原因為粘黏瓣直接壓迫或引起腸扭結。

B. 臨床表現

病人會有腹脹、腹部陣痛、嘔吐，有時會發燒。

C. 治療

1. 支持性療法

鼻胃管引流減壓，禁食，給予足夠之營養、水分及電解質補充。若情況惡化，腹痛由陣發轉為持續及懷疑有腸絞扼現象時就要考慮手術。

2 手術

支持性療法未改善時就要考慮手術。

二、手術內容：

本項手術程序大致包括：

1. 剝離造成腸阻塞之粘黏；
2. 切除已壞死之腸段。

三、手術效益：本項手術預期目標為腸阻塞症狀緩解。

四、手術風險：所有手術都無法保證不會產生合併症及意外狀況，以下所列是可能的併發症：

1. 術後粘黏性腸阻塞。
2. 吻合處滲漏。
3. 腹內膿瘍。