

## 隱睪症手術

### 一、手術適用對象: 主要是針對隱睪症:

- A. 隱睪症: 隱睪症是兒童常見的先天性疾病。大約3%的足月新生兒男嬰有隱睪症，早產兒的比率更高。隱睪症的形成主要是睪丸未降至陰囊內，因此在陰囊內摸不到睪丸。大多數未降的睪丸停留在腹股溝，少數的睪丸仍隱藏於後腹腔。
- B. 腹股溝疝氣的臨床症狀: 病患來找醫師的最常見症狀是陰囊內摸不到睪丸。隱睪症若未處理，長久以後可能會有患側睪丸萎縮、癌化，發生不孕症等。
- C. 腹股溝疝氣的治療: 未降的睪丸在一歲之前都有機會自然下降至陰囊。二歲以後未降的睪丸有較高的機會萎縮、癌化。所以最適合手術的年齡為一至二歲間，手術時間約 20-30 分鐘。

### 二、手術內容:

本項手術程序大致包括:

1. 找出未降的睪丸。
2. 疝氣囊的高位結紮及移除: 隱睪症大多數合併有疝氣。
3. 將睪丸拉至陰囊處並固定。

三、手術效益: 本項手術預期目標為找到未降的睪丸並將之固定於陰囊。

四、手術風險: 所有手術都無法保證不會產生合併症及意外狀況，以下所列是可能的併發症:

1. 睪丸萎縮。
2. 手術傷口感染。
3. 術後局部腫脹。
4. 其他。